

# Инструкция по применению препарата Импаза

Регистрационный номер: P N000374/01-221009

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

## Состав

Активные компоненты: антитела к эндотелиальной NO синтазе аффинно очищенные – 0,003 г\*.

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

\* вводятся в виде водно-спиртовой смеси активной формы действующего вещества<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Активная форма действующего вещества – активная форма с содержанием не более  $10^{-15}$  нг/г действующего вещества.

## Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись IMPAZA.

## Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения нарушений эрекции.

Код АТХ: G04BE

## Фармакологическое действие

Повышает активность эндотелиальной NO-синтазы, восстанавливает выработку эндотелием оксида азота (NO) при сексуальной стимуляции, увеличивает содержание в гладких мышцах циклического гуанозин-монофосфата (цГМФ) и способствует их расслаблению, что приводит к увеличению кровенаполнения пещеристых тел и обеспечивает достаточную по силе и продолжительности эрекцию.

Препарат повышает либидо (половое влечение) и удовлетворенность половым актом.

Регулярное применение препарата способствует повышению содержания тестостерона в сыворотке (при умеренно сниженном исходном уровне).

## Показания к применению

Нарушения эрекции (эректильная дисфункция) различного происхождения.

Вегетативные расстройства климактерического периода у мужчин (слабость, утомляемость, снижение физической активности, снижение либидо и др.).

## Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы

На один прием - 1 таблетку (держать во рту до полного растворения - не во время приема пищи).

*Регулярный прием.* Для стабилизации половой потенции (способности к половому акту) рекомендован лечебно-профилактический курс длительностью не менее 12 недель. В зависимости от выраженности

## Побочное действие

При использовании препарата по указанным показаниям и в указанных дозировках побочного действия не выявлено.

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

## Передозировка

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав лекарственной формы наполнителями.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Возможно применение Импазы на фоне приема нитратов у больных ишемической болезнью сердца (стенокардия напряжения I-II функционального класса), а также применение совместно с бета-адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), антагонистами кальция.

**Особые указания**

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо с врожденной лактазной недостаточностью.

**Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания. По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

Каждую контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.